

Bepanthen® Plus

BAYER

OEMéd

Qu'est-ce que Bepanthen Plus et quand est-il utilisé?

Bepanthen Plus est un désinfectant et un médicament vulnérable (c'est-à-dire qui soigne les plaies) incolore, qui existe sous forme de crème rafraîchissante et de spray. En cas de plaies superficielles, il prévient et combat les infections, tout en favorisant la cicatrisation.

Bepanthen Plus contient de la chlorhexidine. Celle-ci s'attaque aux bactéries qui sont présentes sur la peau ou qui ont pénétré dans la plaie avec les impuretés. De ce fait, il est possible de prévenir ou d'enrayer les infections des plaies.

Bepanthen Plus contient en outre du dexpanthénol comme autre principe actif. Dans la peau, cette substance est transformée en acide pantothénique, une vitamine; celle-ci favorise la formation et la régénération des cellules cutanées de l'intérieur. La formation d'un nouveau tissu cutané est accélérée et la plaie guérit plus rapidement. En outre, l'élasticité de ce nouveau tissu est accrue.

Bepanthen Plus calme la douleur grâce à son effet rafraîchissant. La crème s'applique et s'enlève facilement; elle ne graisse ni ne colle. Le spray peut être vaporisé, ce qui évite d'avoir à toucher la plaie; il ne provoque pratiquement pas de sensation de brûlure.

Bepanthen Plus est indiqué:

- en cas de petites blessures de toute nature, qui risquent de s'infecter: écorchures, coupures, égratignures, crevasses, brûlures légères, intertrigo (inflammation de la peau au niveau des plis);
- en cas d'inflammations de la peau accompagnées d'une infection;
- en cas d'inflammations du mamelon pendant la période d'allaitement;
- uniquement sur prescription médicale en cas de plaies chroniques telles qu'ulcère de jambe (ulcus cruris), escarre de décubitus et plaies opératoires.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

En présence de plaies étendues, profondes et très souillées, telles celles dues à des morsures ou à des objets pointus, l'intervention du médecin est nécessaire (risque de tétanos). Si la taille de la plaie demeure la même pendant quelque temps ou si la cicatrisation ne se produit pas en l'espace de 10–14 jours, il est également nécessaire de consulter un médecin. Il en va de même si les bords de la plaie sont très rouges, si la plaie se met brusquement à gonfler, si elle est très douloureuse ou si la blessure s'accompagne de fièvre (risque d'empoisonnement du sang).

Si la peau est irritée, mais ne présente pas de lésion (coup de soleil, zone de pression, inflammation), il n'existe pratiquement pas de risque d'infection. Utilisez alors non pas Bepanthen Plus, mais un médicament qui ne contient pas de désinfectant.

Quand Bepanthen Plus ne doit-il pas être utilisé?

Si vous présentez une hypersensibilité (allergie) à l'une ou plusieurs des substances contenues dans Bepanthen Plus, vous ne devez pas utiliser ce produit. Si vous avez une lésion du tympan, vous ne devez pas appliquer Bepanthen Plus dans l'oreille.

En présence de plaies graves, profondes et très souillées, ne pas employer Bepanthen Plus. De telles blessures doivent être soignées par le médecin.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/utilisation de Bepanthen Plus?

Veillez à ce que Bepanthen Plus n'entre pas en contact avec les yeux.

Ne pas avaler Bepanthen Plus. Si de grandes quantités ont été absorbées par mégarde, il faut consulter un médecin.

Veillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique, vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Bepanthen Plus peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Bepanthen Plus peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Évitez toutefois de l'appliquer sur de grandes surfaces pendant cette période.

Comment utiliser Bepanthen Plus?

Pour toutes les possibilités d'emploi la dose recommandée chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant est la suivante (voir sous «Qu'est-ce que Bepanthen Plus et quand est-il utilisé?»):

Appliquer Bepanthen Plus Crème ou Bepanthen Plus Spray vulnérable sur les plaies nettoyées ou sur la peau enflammée jusqu'à la guérison complète, une à plusieurs fois par jour selon les besoins.

Appliquer la crème de Bepanthen Plus en fine couche. Vaporiser le spray vulnérable de Bepanthen Plus à une courte distance.

Le traitement de la plaie peut être effectué avec ou sans bandage.

Inflammations des mamelons pendant la période d'allaitement: avant chaque tétée, ôter soigneusement tout reste de crème adhérent aux mamelons.

Veillez vous conformer à la dose figurant dans la notice d'emballage ou prescrite par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou, au contraire, trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Bepanthen Plus peut-il provoquer?

L'utilisation de Bepanthen Plus peut provoquer les effets secondaires ci-après. Dans de rares cas, la peau peut présenter une réaction excessive. Une sensation de brûlure a également été enregistrée après l'application du produit.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Gardez le tube et le spray vulnérable (microdoseur) toujours bien fermés, à l'abri de la chaleur à une température ambiante (15–25 °C), et tenez les hors de portée des enfants.

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Bepanthen Plus?

Bepanthen Plus Crème contient par gramme 50 mg de dexpanthénol et 5 mg de chlorhydrate de chlorhexidine.

Excipients: graisse de laine (E 913) et autres excipients.

Bepanthen Plus Spray vulnérable contient par ml 50 mg de dexpanthénol et 5 mg de gluconate de chlorhexidine ainsi que des excipients.

Numéro d'autorisation

43891, 51739 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Bepanthen Plus? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Crème en tubes de 30 g et 100 g.

Spray vulnérable (microdoseur) de 30 ml.

Titulaire de l'autorisation

Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zurich.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en **avril 2009** par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Ce texte a été approuvé par les autorités et sa publication a été officiellement accordée à la société Documed SA. © Copyright 2009 by Documed SA. Toute utilisation et reproduction sans autorisation est illicite. [09.09.2009]